

### à base de SDHI : inhibiteur de la succinate deshydrogenase

Fongicides à action préventive et curative. 2 traitements maxi par an, 1 application maximum par classe chimique. Protection maxi : 14 jours.

FLUXAPYROXAD	Yaris, Thesis (BASF)	SC	300 g/L	1	208,00	0,15C10	31,20	45		-	H362	H317	H400-410	2	35	5	48	11 à 83	-
--------------	----------------------	----	---------	---	--------	---------	-------	----	--	---	------	------	----------	---	----	---	----	---------	---

### à base de SDHI : inhibiteur de la succinate deshydrogenase + Qoi

Fongicides à action préventive et curative, résistance spécifique. 2 traitements maxi par an, 1 application maxi par classe chimique. Protection maxi : 14 jours (Collis) - 21 jours (Luna à 0,2 l/ha). Fongicides associés à un Qoi (résistance avérée), voir recommandations pour cette famille.

FLUOPYRAM TRIFLOXYSTROBINE	Luna sensation, Luna Xtend (Bayer CropScience) (t)	SC	250 g/L F 250 g/L T	0,3-1	179,00	0,15C14	26,85	50 F 50 T		-	H362	H302	H410	2	14	5	48	15 à 73	-
						0,2C21	35,80												
BOSCALID KRESOXIM METHYL	Collis, Hexagon (BASF) (SpeB)	SC	200 g/L B 100 g/L K	1	78,50	0,4	31,40	80 B 40 K		H351	-	-	H400-410	2	28	5	48	11 à 83	-

### à base d'aryl-Phényl-Kétones : Benzophénone et Benzoylpyridine

Fongicides à action pénétrante et préventive : protection maxi 14 jours, maximum 2 traitements par an, de préférence 1 application par an.

METRAFENONE	Vivando, Algèbre, Ancolie, Harvinta (BASF)	SC	500 g/L	1	130,00	0,2	26,00	100		-	-	-	H411	2	28	5	6	-	-
PYRIOFENONE	Kusabi, Unicicut, Pyrioviti (Belchim Crop Protection)	SC	300 g/L	1-3	79,90	0,3C14	23,97	90		H351	-	-	H410	2	28	5	48	-	-

### à base d'Amidoximes

Fongicide à action pénétrante essentiellement préventive, 1 application maximum de préférence par an. Protection maxi 14 jours.

CYFLUFENAMID	Cyflodiam, Velkado (Certis)	EW	50 g/L	1-5	55,15	0,5	27,58	25		-	-	H315	H411	2	21	5	24	-	-
--------------	-----------------------------	----	--------	-----	-------	-----	-------	----	--	---	---	------	------	---	----	---	----	---	---

### à base d'Amidoximes + IDM

Fongicide pénétrant à action curative, 1 application maximum de préférence par an. Protection maxi : 14 jours.

CYFLUFENAMID DIFENOCONAZOLE	Dynali, Rocca, Conydia (Syngenta)	DC	30 g/L Cy 60 g/L Di	5	57,80	0,5	28,90	15 Cy 30 Di		-	-	-	H410	2	21	5	6	-	-
--------------------------------	-----------------------------------	----	------------------------	---	-------	-----	-------	----------------	--	---	---	---	------	---	----	---	---	---	---

(t) DVP : 5 m C10 Cadence de renouvellement minimum 10 jours C14 Cadence de renouvellement minimum 14 jours C21 Cadence de renouvellement minimum 21 jours

(SpeB) : Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison, ne pas appliquer lorsque les adventices en fleur sont présentes.