

Groupe chimique 6 : **FONGICIDES Á BASE DE Qil**

Fongicide à fixation cuticulaire et systémique (Qil + Phosphite)

2 applications non consécutives. Protection maxi : 14 jours pour la Cyazofamide. En expérimentation, la Cyazofamide montre une protection régulièrement supérieure à 14 jours.

CYAZOFAMIDE DISODIUM PHOSPHONATE	Mildicut, Kenkio, Ysayo (Belchim Crop Protection)	SC	25 g/L C 250 g/L DP	15	13,05	4,5	58,73	112,5 C 1125 DP	-	-	H412	-	3	28	5	6
--	---	----	------------------------	----	--------------	-----	--------------	--------------------	---	---	------	---	---	----	---	---

Fongicide à fixation cuticulaire (Qil)

2 applications maxi non consécutives par an avec cette famille de produits. Produit non recommandé seul (action uni-site).

AMISULBRON	Leimay, Akolit (Philagro)	SC	200 g/L	1-5	62,00	0,375	23,25	75	 	H351	H410	-	2	28	5	6
------------	----------------------------------	----	---------	-----	--------------	-------	--------------	----	---	------	------	---	---	----	---	---

Fongicide à fixation cuticulaire et fongicides de surface (Qil + multi-sites)

2 applications maxi non consécutives par an avec cette famille de produits.

AMISULBRON FOLPEL	Camaro (Adama)	WG	50 g/L A 500 g/L F	5	28,00	1,5	42,00	75 A 750 F	  	H351	H400 - 411	H315 - 317 - 332	2	28	5	48
AMISULBRON MANCOZEBE	Sanblite (UPL France)	WG	30 g/L A 600 g/L M	10	15,21	2,5	38,03	75 A 1500 M	  	H351- 361fd	H400 - 410	H317	2	28	50	48

Groupe chimique 7 : **FONGICIDES SYSTÉMIQUES Á BASE D'ANILIDES**

Bénalaxyl, Mefenoxam, Bénalaxyl-M et fongicides de surface

Présence fréquente avérée de souches résistantes. 2 applications non consécutives. En préventif strict. Utilisation déconseillée en pépinière ou sur attaque déclarée.

BENALAXYL FOLPEL	Tairel F liquide, Amalfi (Belchim Crop Protection)	SC	60 g/L B 385 g/L Fo	15	15,89	2,5	39,73	150 B 962,5 Fo	  	H351	H400 - 411	H317 - 319	2	42	5	48
METALAXYL-M (MEFENOXAM) MANCOZEBE	Eperon pépíte, Ridomil Gold MZ (Syngenta)	WG	3,88 % Me 64 % Ma	9	19,25	2,25	43,31	87,3 Me 1440 Ma	  	H361d	H400 - 410	H317 - 335	2	28	50	48
METALAXYL-M (MEFENOXAM) FOLPEL	Ridgold F pépíte (Syngenta)	WG	4,85 % Me 40 % Fo	8	21,00	2	42,00	97 Me 800 Fo	  	H351	H410	H317 - 319 - 332	2	28 RdT*	5	48
BENALAXYL-M (ISOMERE) MANCOZEBE	Sidocar, Capri (Philagro)	WP	4 % B 65 % Ma	10	18,50	2,5	46,25	100 B 1625 Ma	  	H361d	H400 - 410	H317	3	42	5	48
BENALAXYL-M (ISOMERE) FOLPEL	Fantic F WG, Palmir (Phyteurop)	WG	3,75 % B 48 % Fo	10	21,30	2	42,60	75 B 960 Fo	  	H351	H410	H317 - 318 - 332	2	42 RdT*	5	48

RdT* : jusqu'à stade BBCH 69 pour raisins de table.

Fongicides