

## Groupe chimique 6 : FONGICIDES A FIXATION CUTICULAIRE À BASE DE QIL

### Fongicides à fixation cuticulaire et systémique (Qil + Phosphonate)

De préférence 1 application maxi par an. Protection maxi : 14 jours pour la *Cyazofamide*. Résistances avérées.

Substance active	Nom commercial	Sous forme	Concentration en s.a.	Emballage kg ou L	Prix € HT kg ou L	Dose/ha kg ou L	Prix €/ha	g/ha s.a.	Restrictions d'utilisation (cf. marque-page)						Stade BBCH d'intervention	DSR en m			
									Pictogramme de danger	Avertissements mentions danger H3/H4			Nb appl. AMM	DAR			ZNT en m	DRE en h	
										CMR	Reprotoxique	Autres							Environnement
CYAZOFAMIDE DISODIUM PHOSPHONATE	Mildicut, Kenkio, Ysayo (1) (Belchim Crop Protection)	SC	25 g/L C 250 g/L DP	15	13,00	4,5	58,50	112,5 C 1125 DP	-	-	-	-	H411	1	21	5	6	-	-

### Fongicides à fixation cuticulaire (Qil)

1 application maxi par an avec cette famille de produits. Produit non recommandé seul (action uni-site). A associer avec un autre partenaire.

AMISULBRON	Leimay, Akolit (Philagro) (1)	SC	200 g/L	1-5	60,00	0,375	22,50	75		H351	-	-	H410	2	28	5	48	-	-
------------	-------------------------------	----	---------	-----	-------	-------	-------	----	--	------	---	---	------	---	----	---	----	---	---

### Fongicides à fixation cuticulaire et fongicides de surface (Qil + multi-sites)

1 application maxi par an avec cette famille de produits.

AMISULBRON FOLPEL	Camaro (Adama)	WG	50 g/L A 500 g/L Fo	5	30,50	1,5	45,75	75 A 750 Fo		H351	-	H315-317-332	H400-411	2	28	5	48	-	-
CYAZOFAMIDE FOLPEL	Videryo F (Belchim Crop Protection) (3)	SC	40 g/L A 400 g/L Fo		19,20	2,5C10	48,00	100 A 1000 Fo				H317-332	H400-410			20			

## Groupe chimique 7 : FONGICIDES SYSTÉMIQUES À BASE D'ANILIDES

### Bénalaxyl, Mefenoxam, Bénalaxyl-M et fongicides de surface

Présence fréquente avérée de souches résistantes. 2 applications maxi par an non consécutives. En préventif strict. Utilisation déconseillée en pépinière ou en situation de risque élevé sur attaque déclarée.

BENALAXYL-M (ISOMERE) CUIVRE	Fantic A, Archimède, Bandido (Phyteurop) (Spe1)	WG	5 % B 30 % Cu	10	23,00	2	46,00	100 B 600 Cu		-	-	H302 - 317 - 318 - 331	H400 - 410	2	40	50	48	-	-
BENALAXYL-M (ISOMERE) FOLPEL	Fantic F, Capri F (Gowan) Palmir, Stadium (Phyteurop)	WG	3,75 % B 48 % Fo	4-10	23,00	2	46,00	75 B 960 Fo		H351	-	H317-318-332	H410	2	42	5	48	-	-
MÉTALAXYL-M (MEFENOXAM) FOLPEL	Pandero Gold (Adama)	WG	4,85 % Me 40 % Fo	8	25,00	2	50,00	97 Me 800 Fo											

RdT\* : jusqu'à stade BBCH 69 pour raisins de table. C10 Cadence de renouvellement minimum de 10 jours. (1) DVP : 5 m (3) DVP : 20 m (Spe1) : Pour protéger les organismes du sol, ne pas appliquer ce produit ou tout autre produit contenant du cuivre à une dose annuelle totale supérieure à 4 Kg de Cu métal/Ha.