

Insecticides à positionner au début des premières éclosions

● Pyréthriinoïdes

39

Substance active	Nom commercial	Sous forme	Concentration en s.a.	Emballage kg ou L	Prix € HT kg ou L	Dose/ha kg ou L	Prix €/ha	g/ha s.a.	Restrictions d'utilisation (cf. marque-page)							Stade BBCH d'intervention	DSR en m		
									Pictogramme de danger	Avertissements mentions danger H3/H4			Nb appli. AMM	DAR	ZNT en m			DRE en h	
										CMR2	Environnement	Autres							
CYPERMETHRINE	Sherpa 100 EW (Nufarm SAS)	EW	100 g/L	5	12,00	0,25	3,00	25		-	H410	H315 - 317 - 335	2	7	50	48	-	-	
	Cyperfor 100 EW (De Sangosse)				0,25 C21	H302 - 304 335 - 336													
	Cythrène L (UPL France)	EC	500 g/L	10,00	0,3			H304 - 315 - 318 332 - 335 - 336	1	21	24								
	Cythrène Max (UPL France)			50,00	0,06														
DELTAMETHRINE	Décis Protech (Bayer CropScience)	EW	15 g/L	5	18,27	0,83	15,16	12,45		-	H410	-	3	14 7 RdT	20	6	-	-	
	Deltastar (Ascenza France)				15,00														
LAMBDA-CYHALOTHRINE	Karaté Zéon, Karaté Xflow, Kusti (Syngenta)	CS	100 g/L	1	88,75	0,175	15,53	17,5		-	H410	H302 - 317 - 332	2	7	50	48	-	-	
	Karis 10 CS, Spark (FMC)			1-5	74,00		12,95					H302 - 332				3			6
	Karakas, Cordoba, Alicante (Ascenza France)			5	75,00		13,13												
ETOEFENPROX	Trebon 30 EC, Uppercut (3)	EC	287,5 g/L	1-5	66,46	0,4	26,58	115		-	H400 - 410	H304 - 315 - 318 336 - 362	1	14	50	48	-	-	

CICADELLE DE LA FLAVESCENCE DOREE *Scaphoideus titanus*

La lutte contre cette maladie repose sur la prophylaxie (éradication de tout cep malade), l'utilisation de matériel sain, le traitement à l'eau chaude si nécessaire et la destruction du vecteur grâce à des traitements en végétation aux dates indiquées par les avertissements agricoles. Conformément à l'arrêté ministériel du 19/12/2013 (consolidé au 01/01/2014), la lutte contre la flavescence dorée et son agent vecteur est rendue obligatoire sur les vignobles concernés ainsi que sur l'ensemble des vignes-mères et pépinières. Les modalités pratiques de lutte doivent être précisées à l'échelon local selon les recommandations techniques du Service Régional de l'Alimentation (SRAL) en liaison avec les organisations professionnelles. Vérifier le bon usage de la cible visée (cicadelle verte ou Flavescence dorée) sur l'étiquette de chaque spécialité commerciale.

Insecticides autorisés sur cicadelles de la flavescence dorée uniquement

ESFENVALERATE	Mandarin Gold, Judoka Gold, Tatami Gold (Philagro)	EW	50 g/L	1-5	35,00	0,3	10,50	15		-	H400 - 410	H302 - 371 - 373	3	21	20	6	-	-
PYRETHRE NATUREL	Pyrevert (Valagro France)	EC	18,61 g/L	5-10	57,20	1,5	85,80	27,91		-	H410	-	3	28	50	6	-	-

C21 Cadence de renouvellement minimum 21 jours **(3)** DVP : 20 m

: Pour protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas utiliser en présence d'abeilles et autres insectes pollinisateurs, ne pas appliquer durant la période de floraison, ne pas appliquer lorsque les adventices en fleur sont présentes.

Insecticides